

Servicios de Salud del Distrito Escolar de Salt Lake City

Pautas para enfermedades que requieren exclusión:
excluir al estudiante según los criterios enumerados a continuación

- **CONJUNTIVITIS:** se define como conjuntiva rosada o roja con secreción blanca o amarilla, a menudo con párpados enmarañados después de dormir, e incluye a un niño con dolor ocular, enrojecimiento de los párpados o piel que rodea el ojo. Hasta que se trate con la medicación prescrita, durante 24 horas.
- **TOS:** Tos excesiva no controlada. Acompañada de fiebre o malestar.
- **LLANTO/IRRITABILIDAD:** El llanto o la irritabilidad persistentes pueden ser un signo de enfermedad.
- **DIARREA:** se define como un mayor número de deposiciones o un cambio de consistencia en comparación con el patrón normal del niño. Dos o más deposiciones blandas durante el día escolar. No puede contener las heces en el inodoro o el pañal. Acompañada de fiebre o malestar.
- **DIFICULTAD PARA RESPIRAR:** Falta de aliento. Sibilancias si no las ha evaluado y tratado previamente un profesional de la salud.
- **SECRECIÓN:** Cualquier secreción de oídos, ojos, nariz, boca o heridas abiertas que no se puedan contener.
- **FIEBRE:** se define como una temperatura $\geq 100.4^{\circ}$ F. Hasta que la temperatura esté dentro del rango normal durante 24 horas.
- **IMPÉTIGO:** Hasta que las llagas se sequen o se puedan cubrir con un vendaje. O sean tratadas con medicamentos recetados durante 24 horas.
- **INFESTACIÓN:** Sarnilla, hasta 24 horas después de iniciado el tratamiento. No es necesaria la exclusión de 24 horas por pediculosis (consulte la Política sobre pediculosis de SLCSO).
- **LLAGAS BUCALES:** Llagas en la boca excesivas que hacen que sea muy incómodo asistir a la escuela. Acompañadas de fiebre. Incapacidad para tragar o babeo excesivo.
- **PARASITOS: OXIUROS (LOMBRIZ INTESTINAL):** Hasta recibir el primer tratamiento de antibióticos orales.
- **SARPULLIDO:** Cualquier sarpullido difuso no evaluado y tratado previamente por un profesional de la salud. Sarpullido con fiebre o malestar.
- **INFECCIÓN POR TIÑA:** Hasta que haya comenzado el tratamiento.
- **DOLOR DE GARGANTA:** Incapacidad para tragar. Acompañada de fiebre o malestar.
- **ANGINAS:** Hasta 12 horas después de que se haya iniciado el antibiótico. Hasta que no haya tenido fiebre durante 24 horas.
- **VARICELA:** Hasta que se sequen todas las lesiones y formen costras (alrededor de 6 días).
- **VÓMITOS:** Dos o más episodios de vómitos en las 24 horas anteriores. Vómitos en la escuela acompañados de fiebre o malestar.